

Distrito Escolar Independiente de McKinney

Servicios Escolares de la Salud

Hoja de datos sobre salpullidos

Diagnósticos diferenciales de las enfermedades comunes de la niñez asociadas con el salpullido

	Rubéola (Sarampión rojo)	Rubéola (Sarampión alemán)	Roséola	Fiebre escarlatina	Quinta enfermedad	Varicela (Viruelas locas)
Etiología	Virus de la Rubéola	Virus de la rubéola	Aún no se ha identificado. Probable que sea más de un virus	Estreptococo del Grupo A	Parvovirus	Varicela Virus tipo Zoster
Características del salpullido	Manchas rojas muy severas que se juntan	Manchas rojas leves que no se juntan	Manchas rojas leves que no se juntan	Rubor rojo, la piel parece "de gallina" y se pone pálida al apretarse	Roja (como una mejilla abofeteada) luego se torna como redecilla	Ampollas pequeñas y claras, rojizas alrededor. Pronto forman costra o escara.
Parte del cuerpo donde primero aparece el salpullido	En la frente, detrás de las orejas, en la cara y el cuello	En la frente, las mejillas y el cuello	En la cara, el pecho y abdomen	En la parte superior del pecho y en la cara	En las mejillas	En el cuero cabelludo, la cara el pecho y el abdomen
Se propaga a	El pecho, las piernas, el abdomen y los brazos	El pecho y abdomen	Se propaga muy poco	La parte baja del pecho, el abdomen y los brazos	El pecho, abdomen brazos y piernas	Armas y brazos
Progresión y los intervalos de tiempo para el diagnóstico	Fiebre, luego ojos rojos, luego untos. Salpullido al final del 2do. día o al comienzo del 3ro. cuando la fiebre está bien alta	1er. día: fiebre; 2do. día: fiebre y salpullido; 3er. día: todo ha desaparecido	Del 1ro. al 3er. día: fiebre; al final del 3er. día o principio del 4to. día: la fiebre se va y aparece el salpullido	El salpullido y la fiebre comienzan el 1er. día; 5 a 7 días después la piel se despelleja o se pone como escamas	Fiebre por 2 o 3 días una semana antes de comenzar el salpullido en las mejillas; de 1 a 4 días más tarde, un salpullido en forma de encaje aparece en todo el cuerpo	El salpullido y la fiebre empiezan casi al mismo tiempo durante el 1er. o 2do. día; cuando termina la fiebre, también se terminan las ampollas
Severidad de la enfermedad	Usualmente severa	Usualmente leve	Leve, pero con fiebre muy alta	De leve a moderada	Leve	Leve a moderada; severa en los adolescentes mayores y adultos
Síntomas asociados que no son salpullido	Fiebre alta, ojos rojos, tos severa, picazón leve	Fiebre baja, nódulos linfáticos, dolor en el cuello y la nuca	Usualmente nada	Las amígdalas y la faringe exudan pus y la lengua duele	Fiebre leve a moderada	Fiebre y picazón
Complicaciones	Inflamación mediana de los oídos, pulmonía, encefalitis	Usualmente ninguna, artritis ocasional	Usualmente ninguna	Se pueden afectar los riñones y el sistema cardíaco	Dolor en las coyunturas y artritis	Usualmente ninguna
Período de Inactividad	Desde un día antes de que comience la fiebre hasta un día después que aparece el salpullido	Desde un día antes de que comience la fiebre hasta un día después que aparece el salpullido	La duración de la fiebre	Desde un día antes de que se cure la fiebre con antibióticos, o una semana después que aparece el salpullido	Por 2 o 3 días como a una semana antes de que aparezca	Desde un día antes de que comience la fiebre hasta que se sequen todas las costras, o 5 días después de la primera aparición del salpullido